


 <p>ETAT DE FRIBOURG STAAT FREIBURG</p>	<h2>Kurzfassung der Zusatzmassnahmen - Kontakt</h2>	<p>Code: REF-161_D Fichier : F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI Version: 1</p>
--	---	--

Übertragungswege: durch direkten oder indirekten Kontakt.



Die Hände des Personals sind bei der Übertragung die Haupttreiber.

ZUSÄTZLICHE MASSNAHMEN ZU DEN STANDARDMASSNAHMEN	
Information Bewohner/in	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung Zusatzmassnahmen Kontakt auf ärztliche Verordnung - Gründe für die getroffenen Massnahmen erklären - Indikationen und Händedesinfektionstechnik erklären - Desinfektionsmittel bereitstellen
Unterbringung Bewohner/in	<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung im Einzelzimmer mit WC oder eigenem Toilettenstuhl oder - Kohortierung möglich (mehrere Bewohnende mit dem gleichen Krankheitserreger im gleichen Zimmer) mit WC oder eigenem Toilettenstuhl oder - geografische Trennung mit WC oder eigenem Toilettenstuhl
Fortbewegung / Verlegung Bewohner/in	<ul style="list-style-type: none"> - die Empfängerstelle vor der Verlegung der/des Bewohnenden informieren - Verlassen des Zimmers auf die Grundbedürfnisse beschränken - Verlassen des Zimmers mit sauberer Kleidung, Schutz und Bettwäsche - Infektions- oder Trägerregion isolieren (bspw. Verband, Urinbeutel leeren usw.) - für den Transport keine Schürze und Handschuhe für Bewohnende/n und Begleitperson
Schürze 	<ul style="list-style-type: none"> - bei direkten Aktivitäten mit der/dem Bewohnenden im Zimmer - bei direktem Kontakt mit der Umgebung der/des Bewohnenden im Zimmer - kann während 24 Stunden verwendet werden (höchstens zwei Schürzen auf einem Ständer im Zimmer)
Information von Besuchenden	Über die Isolationsmassnahmen und die anzuwendenden Massnahmen informieren: <ul style="list-style-type: none"> - bei Betreten und Verlassen des Zimmers Hände desinfizieren. Ausser bei Sporen von <i>C. difficile</i> und Krätze-Parasiten, Händewaschen mit Wasser und Seife, - Tragen einer Schürze bei nahem Kontakt, - die Zimmertoiletten nicht benutzen, - nicht aufs Bett sitzen.