

Comment distinguer la Corneille noire du Corbeau freux?

Wie unterscheidet man die Rabenkrähe von der Saatkrähe?



Corbeau freux / *Saatkrähe*



Corbeau freux / *Saatkrähe*



Corneille noire / *Rabenkrähe*



Corneille noire / *Rabenkrähe*

La base du bec des **Corbeaux freux** adultes est blanc grisâtre et leurs narines sont visibles, car dépourvues de plumes.

Chez la **Corneille noire**, le bec et la tête sont entièrement foncés et les narines sont recouvertes de plumes. Voir aussi la courbure de la partie supérieure du bec. Ce dernier critère permet de distinguer les Corneilles aussi des jeunes Corbeaux freux (qui ont la tête et le bec encore entièrement noirs).

*Bei ausgewachsenen **Saatkrähen** ist die Schnabelbasis weisslich oder gräulich und die Nasenöffnungen sind nicht befiedert.*

*Bei der **Rabenkrähe** sind der ganze Schnabel und das Gesicht dunkel und die Nasenöffnungen sind befiedert. Beachte auch die Krümmung des Oberschnabels. Dieses Kriterium erlaubt auch das Unterscheiden der Rabenkrähen von jungen Saatkrähen, deren Schnabelbasis noch dunkel ist.*