

Recommandations manipulation du linge souillé par des liquides biologiques pour le personnel soignant en EMS et en institutions spécialisées pour adultes

Les EMS et les institutions spécialisées pour adultes accueillent des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie, immuno-déficientes, vulnérables et fragiles. La manipulation et le traitement inapproprié du linge souillé par des liquides biologiques représente un risque de transmission croisée des micro-organismes.

Objectif : Maitriser le risque de transmission croisée via les bonnes pratiques de la manipulation du linge souillé par des liquides biologiques par les professionnel-le-s au sein de l'établissement.

Avant tout, toujours manipuler avec des gants propres à usage unique le linge souillé par des liquides biologiques. Désinfection des mains après toute manipulation de linge sale, après le retrait des gants propres à usage unique.

Recommandations lors du transport du linge sale/souillé par des liquides biologiques :

- Eviter le contact entre le linge sale et la tenue professionnelle



- Eviter le contact entre le linge sale et le linge propre
- Ne pas poser le linge sale à terre
- Ne pas traîner les sacs de linge sur le sol mais effectuer leur transport interne dans les chariots/containers strictement réservés à cet usage



Nom et emplacement du fichier	Page
Recommandations manipulation du linge souillé par des liquides biologiques pour le personnel soignant en EMS/Site internet HPCI Fribourg	

Recommandations lors de la prise en charge du linge sale/souillé par des liquides biologiques :

- Ne pas rincer, tremper le linge sale dans les unités (salle de bain, vidoir, ...) et/ou en chambre
- Dégrossir le linge sale avec des serviettes de papier absorbant (= papier essuie-mains)
- Déposer le linge sale dégrossi dans un sac en plastique hermétiquement fermé et le déposer dans le sac à linge

Recommandations lors de l'évacuation du linge sale/souillé par des liquides biologiques :

- Déposer au plus vite le linge sale dans le sac à linge servant à son transport
- Ne pas remplir les sacs de linge au-delà des 2/3 de leur capacité



- Ne pas transvaser de linge sale d'un sac à un autre
- Bien fermer les sacs de linge avant leur transport
- Les sacs à linge sont stockés dans le local sale (vidoir)

Référence :

- Précautions Standard, Guide romand pour la prévention des infections associées aux soins, 3^{ème} édition, avril 2017.

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
Recommandations manipulation du linge souillé par des liquides biologiques pour le personnel soignant en EMS/site internet HPCI Fribourg	2 / 2	4/23/2024