

BVD

Diarrhée Virale Bovine

Symptômes et transmission




ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen LSVW

Types d'infection

Infection transitoire (IT)




Animal sain attrape le virus

Animal contagieux 4-10 jours
Gestation dès le 5ème mois

Guérison (porteurs d'anticorps Y)

Infection permanente immunotolérante (IPI)




Infection de la vache portante entre le 1er et 4e mois de gestation



Infection intra-utérine

Veau contagieux à vie ne développe jamais d'anticorps
Mère guérie et porteuse d'anticorps Y

Symptômes



Les tests

-  Tester pour les **virus** permet de détecter les infections :
Test positif → animal contagieux
-  Tester pour les **anticorps** permet de savoir si l'animal a déjà eu la BVD
Test positif → animal sain (guéri) qui a eu la BVD dans le passé

CONTACT

Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires SAAV
Amt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen LSVW

Santé animale
Impasse de la Colline 4
1762 Givisiez
T +41 26 305 80 70
www.fr.ch/saav
—
Courriel: saav-sa@fr.ch

