


DOCUMENT DE REFERENCE
Hépatite B – EMS et en institutions
spécialisées pour adultes

Code : REF-207_F
Type institution : EMS
Fichier : F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI
Version : 1 du 1.10.2024

| Informations générales | |
|--|--|
| Informations générales sur l'agent infectieux | Le virus de l'hépatite B (virus ADN) provoque une maladie inflammatoire du foie d'origine infectieuse, l'hépatite B. |
| Mode de transmission | <ul style="list-style-type: none"> • Par contact direct avec les liquides biologiques infectés (exemple : le sang, la salive, le sperme, les sécrétions génitales, les larmes) • Par contact direct avec des lésions de la peau et/ou des muqueuses • Par relation sexuelle génitale, anale et orale • Par le partage de matériel infecté ; tels que des seringues ou aiguilles usagées lors de la consommation de drogue ou d'une piqûre accidentelle dans le domaine professionnelle |
| Période d'incubation | Entre 4 semaines et 6 mois /45 jours à 180 jours |
| Période de contagiosité | Pendant toute la période de l'infection avec la présence d'antigènes Ag HBs et/ou Ag HBe, peut durer toute la vie |
| Mesures Additionnelles (MA) à mettre en place sur avis médical | <p>AUCUNE, seule les Précautions Standard suffisent</p>  |

| Prise en charge du résident-e | |
|-------------------------------|---|
| Mesure préventive | <ul style="list-style-type: none"> • Vaccination du personnel à jour, selon les recommandations de l'OFSP et la CFV • Déclarer tous les accidents à risque d'exposition avec du sang et/ou des liquides biologiques |

| Nom et emplacement du fichier | Page |
|--|------|
| F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI\REF-207_F_HPCI_hépatite B_EMS_institutions spécialisées pour adultes.docx | |

| | |
|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Possibilité de se vacciner 7 jours post-exposition avec ou sans immunoglobulines spécifiques |
| Mesure spécifique | <ul style="list-style-type: none"> • En cas d'accident par exposition au sang (AES) et/ou autres liquides biologiques, faire une déclaration d'accident afin d'évaluer l'indication à une éventuelle prophylaxie post-expositionnelle |
| Chambre | <ul style="list-style-type: none"> • Lors de l'infection à l'hépatite B à l'admission ou en cours de séjours à l'EMS ou en institutions spécialisées pour adultes : pas de mesures particulières, chambre double possible |
| Sanitaire | Pas de mesure particulière |
| Circulation | Pas de mesure particulière La-le resident.e est libre de circuler et de participer aux animations. |
| Equipement de Protection Individuel (EPI) pour le personnel | <u>En cas d'infection à l'hépatite B :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Respect des Précautions Standard (PS) (désinfection es mains avec une solution hydroalcoolique, port de gants seulement si risque avec les liquides biologiques, les muqueuses ou lésions de la peau et surblouse si risque de projection de liquide biologique ...) |
| Matériel de soins | <ul style="list-style-type: none"> • Désinfection du matériel de soins à usage multiple après chaque utilisation • Privilégier le matériel à usage unique |
| Evacuation du linge et vêtements | Filière habituelle, selon les Précautions Standard, soit : <ul style="list-style-type: none"> • Sacs à linge usuels dans le vidoir, double emballage si souillé avec des liquides biologiques • Ne pas rincer le linge et/ou habit à cause des risques de projection |
| Evacuation de la vaisselle | Aucune procédure particulière, suivre la filière habituelle (pas de vaisselle jetable) |
| Elimination des déchets | Filière habituelle, selon les Précautions Standards |
| Voisin-e de chambre | Pas de mesures particulières |
| Visites | <ul style="list-style-type: none"> • Autorisée • Pas de mesures particulières |

| Nettoyage/Désinfection | |
|-------------------------------|---|
| Matériel de soins | Nettoyage/Désinfection du matériel de soins entre chaque résident.e avec le détergent/désinfectant habituel |
| Linge et vêtements | <p>Selon les Précautions Standard :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage de la literie et du linge de bain à la machine à 60°C • Nettoyage des vêtements du résident.e à minimum 40°C • Changer le linge de lit et le linge de bain dès souillures et selon les règles institutionnelles |
| Environnement | <ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage/Désinfection de l'environnement direct du résident. (table de nuit, moyens auxiliaires, téléphone, sonnette, accoudoirs, télécommande, ...), des sanitaires et du sol avec le détergent-désinfectant habituel |

| Déclaration obligatoire | |
|--------------------------------|--|
| Médecin cantonal | <p>Oui, dans un délai de 1 semaine, via le formulaire de OFSP A l'adresse e-mail : maltrans@secu.fr.ch</p> |

| | |
|-------------------|--|
| Références | <ul style="list-style-type: none"> - Document adapté des recommandations pour la prévention de l'hépatite B de l'OFSP - Document adapté du Guide de la déclaration obligatoire des maladies infectieuses et agents pathogènes 2024 de l'OFSP - Document adapté du OFSP-Bulletin 13/2019 |
|-------------------|--|

| Nom et emplacement du fichier | Page | Date |
|---|-------|------------|
| Fiche agent pathogène/site internet HPCI Fribourg | 3 / 5 | 25/06/2022 |

A plastifier et à coller sur la porte d'entrée de la chambre

| Nom et emplacement du fichier | Page | Date |
|--|-------|------------|
| <i>Fiche agent pathogène/site internet HPCI Fribourg</i> | 4 / 5 | 25/06/2022 |

RESUME DES MESURES SPECIFIQUES

Précautions Standard **UNIQUEMENT**

10 PRÉCAUTIONS STANDARD



1 HYGIÈNE DES MAINS

Désinfection hydro-alcoolique des mains avant et après tout geste de soins.
Lavage des mains au savon doux pour les mains visiblement souillées.



2 GANTS

Si risque de contact avec du sang, des liquides biologiques, muqueuses, peau lésée.
1 paire pour 1 soin pour 1 patient.
Soin ou patient différent = changement de gants.



3 MASQUE ET LUNETTES/ VISIÈRE

Si risque de projections de liquides biologiques.
Lors de symptômes respiratoires (toux, rhinite etc.)



4 SURBLOUSE ET/OU TABLIER

Si risque de projections de liquides biologiques.
Usage unique par patient.



5 DISPOSITIFS MÉDICAUX ET MATÉRIEL

Privilégier le matériel à usage unique. Le matériel à usage multiple doit être retraité après chaque utilisation et en fonction du niveau de risque.



6 LINGE

Planifier, séparer et respecter le circuit du linge sale et propre.
Se désinfecter les mains avant de manipuler du linge propre et après avoir manipulé le linge sale.



7 DÉCHETS

Utilisation des safe box pour les piquants/coupants/tranchants.
Éliminer les autres déchets en respectant les différentes filières d'élimination (excepté en ambulatoire et EMS, à jeter aux déchets urbains).



8 ENVIRONNEMENT

Entretien des locaux selon leur classification en utilisant des produits détergents/désinfectants.
Porter des gants et se désinfecter les mains au retrait.



9 PROTECTION DU PERSONNEL

Vaccination hépatite B, couverture vaccinale conforme aux recommandations de l'OFSP.
Procédure lors d'un accident avec exposition au sang (AES).



10 PROTECTION DES PATIENTS

Isoler les patients avec des signes d'infection dans les lieux d'accueil.
Port de masque par le soignant et le patient si symptômes respiratoires.